



PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

maleato de dexclorfeniramina creme não é indicado para uso nos olhos (oftálmico).

Deve-se evitar a exposição à luz do sol das áreas tratadas com maleato de dexclorfeniramina creme, pois podem ocorrer reações indesejáveis na pele.

O tratamento deverá ser suspenso se ocorrer sensação de queimação, erupções, desenvolvimento de irritações ou se não houver melhora do quadro.

Evite o uso prolongado ou o uso em áreas extensas da pele, principalmente em crianças.

Não se deve aplicar maleato de dexclorfeniramina creme em: áreas da pele que apresentem bolhas, em áreas da pele que não estejam íntegras ou que apresentem secreção, ao redor dos olhos, genitália ou em outras mucosas.

Deve-se evitar cobrir a área que está sendo tratada.

Uso em crianças e idosos

Em casos raros, a absorção pela pele do maleato de dexclorfeniramina creme, pode provocar excitabilidade, principalmente em crianças.

A segurança e eficácia deste produto não foram estabelecidas em crianças abaixo de 2 anos de idade.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO NA FAIXA ETÁRIA ABAIXO DE 2 ANOS DE IDADE, INCLUINDO RECÉM-NASCIDOS E PREMATUROS.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

A segurança para o uso na pele de antialérgicos durante a gravidez e a amamentação não está estabelecida.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SOBRE O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O tratamento com antialérgicos deverá ser suspenso aproximadamente 48 horas antes de se efetuar qualquer tipo de teste laboratorial na pele pois o uso do produto poderá interferir no resultado do exame.

REAÇÕES ADVERSAS

Junto com os efeitos necessários para seu tratamento, os medicamentos podem causar efeitos não desejados. Apesar de nem todos estes efeitos colaterais ocorrerem, você deve procurar atendimento médico caso algum deles ocorra.

Antialérgicos para uso na pele podem causar sensibilização e irritação local, especificamente com o uso prolongado.

Efeitos colaterais sistêmicos têm sido reportados após aplicação na pele de antialérgicos em áreas extensas.

POSOLOGIA

Aplicar maleato de dexclorfeniramina creme sobre a área da pele afetada duas vez ao dia.

Como usar

maleato de dexclorfeniramina creme só deve ser aplicado externamente. Não deve ser aplicado nos olhos, boca e nariz e não deve ser utilizado em áreas extensas da pele, principalmente em crianças.

"Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou do seu cirurgião-dentista".

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

SUPERDOSE

Este medicamento deve ser utilizado somente na dose recomendada. Se você utilizar grande quantidade deste medicamento, procure imediatamente socorro médico, levando também a bula do produto.

PACIENTES IDOSOS

Não há recomendações especiais ou posologia diferenciada para pacientes idosos (acima de 60 anos).

Registro M.S. nº 1.0465.0463
Farm. Responsável: Dr Marco Aurélio Limório G. Filho CRF-GO nº 3524
Nº do Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: **VIDE CARTUCHO.**

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto **Neo Química**.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação,

ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.

VP R 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

www.neoquimica.com.br

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira



743 - 00102
3005641 - 09/2008

maleato de dexclorfeniramina

Medicamento genérico lei nº 9.787, de 1999



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Creme dermatológico: embalagens contendo 01, 06", 12", 25" e 50" bisnagas de 30g.

*Embalagem Hospitalar

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO DERMATOLÓGICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama do creme contém:

maleato de dexclorfeniramina 10mg

excipientes q.s.p 1g

(cera auto emulsificante aniônica, palmitato de cetila, petrolato líquido, alantoína, álcoois alifáticos de lanolina, composto de fenoxietanol e parabenos, glicerol, sorbitol, essência de alfazema e água).

Obs: pode ser utilizado ácido clorídrico ou hidróxido de sódio durante a fabricação para ajustar o pH.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- **Ação esperada do medicamento:** maleato de dexclorfeniramina pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como antialérgicos (anti-histamínicos). Os antialérgicos (anti-histamínicos) ajudam a reduzir os sintomas de alergia causados por substâncias estranhas que entram em contato com nosso corpo. maleato de dexclorfeniramina creme contém alantoína que estimula a regeneração da pele.

- **Cuidados no armazenamento:** Conservar em temperatura ambiente entre 15° a 30° C. Proteger da luz e umidade.

- **Prazo de validade: 24 MESES.** Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, pode ser prejudicial à sua saúde.

- **Gravidez e Lactação:** A segurança para o uso na pele de antialérgicos durante a gravidez e a amamentação não está estabelecida. "Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". "Informe ao seu médico se está amamentando".

- **Cuidados de administração:** maleato de dexclorfeniramina creme não é indicado para o uso nos olhos (oftálmico). Deve-se evitar a exposição à luz do sol das áreas tratadas com maleato de dexclorfeniramina creme, pois podem ocorrer reações indesejáveis na pele. O tratamento deverá ser suspenso se ocorrer reações indesejáveis na pele como: sensação de queimação, erupções, desenvolvimento de irritações ou se não houver melhora do quadro. Evite o uso prolongado ou o uso em áreas extensas da pele, principalmente em crianças.

- **"Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".**

- **USO EM CRIANÇAS E IDOSOS:** Em casos raros, a absorção pela pele do maleato de dexclorfeniramina creme pode provocar excitabilidade, principalmente em crianças. A segurança e eficácia deste produto não foram estabelecidas em crianças abaixo de 2 anos de idade.

- **"Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista".**

- **"Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista sobre o aparecimento de reações indesejáveis".**

- **"Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento".**

- **Interrupção do tratamento:** "Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico".

- **Reações adversas:** Junto com os efeitos necessários para seu tratamento, os medicamentos podem causar efeitos não desejados. Apesar de nem todos estes efeitos colaterais ocorrerem, você deve procurar atendimento médico caso algum deles ocorra.

- **Antialérgicos para uso na pele podem causar sensibilização e irritação local, especificamente com o uso prolongado.** Efeitos colaterais sistêmicos têm sido reportados após aplicação na pele de antialérgicos em áreas extensas.

- **"Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, especialmente se forem intensas ou persistentes".**

- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".**

- **Interações medicamentosas com testes laboratoriais:** O tratamento com antialérgicos deverá ser suspenso aproximadamente 48 horas antes de se efetuar qualquer tipo de teste laboratorial na pele pois o uso do produto poderá interferir no resultado do exame.

- **Contra-indicações e precauções:** Não utilize maleato de dexclorfeniramina creme se você já teve algum tipo de reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto.

- **"ESTE MEDICAMENTO É CONTRA-INDICADO NA FAIXA ETÁRIA ABAIXO DE 2 ANOS DE IDADE, INCLUINDO RECÉM-NASCIDOS E PREMATUROS".**

- **"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE".**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características farmacológicas: maleato de dexclorfeniramina creme pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como anti-histamínicos. Os anti-histamínicos ajudam a reduzir os sintomas de alergia causados pela liberação de substâncias estranhas que entram em contato com nosso corpo. A presença de alantoína confere ao medicamento uma ação antiinflamatória e cicatrizante.

INDICAÇÕES

É indicado para o alívio do prurido, alergias, coceiras, urticária e picadas de inseto.

CONTRAINDICAÇÕES

NÃO UTILIZE MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA CREME SE VOCÊ JÁ TEVE ALGUM TIPO DE REAÇÃO INCOMUM A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA DO PRODUTO.

