



simeticona



FORMA FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Emulsão oral 75mg/mL:

Embalagem com 200 frascos de 10 mL.

Embalagem com 200 frascos de 15 mL.

Comprimidos 40mg:

Embalagem com 20 blisters de alumínio e plástico transparente contendo 10 comprimidos cada.

USO ORAL.

EMULSÃO ORAL: USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPRIMIDO: USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO:

Emulsão oral:

Cada mL (15 gotas) da emulsão oral contém:
simeticona 75 mg

Excipientes q.s.p. 1 mL

Excipientes: propilenoglicol, goma xantana, metilparabeno, propilparabeno, ciclamato de sódio, sacarina sódica, aroma de cereja, corante vermelho allura 129, ácido cítrico, óleo de rícino hidrogenado etoxilado, celulose microcristalina, caramelo sódica e água purificada.

Atenção: Contém o corante vermelho allura 129 que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.

Comprimido 40mg:

Cada comprimido contém:

simeticona 40 mg

Excipientes q.s.p. 1 comprimido

Excipientes: celulose microcristalina, povidona, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico.

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

SIMETICONA é indicado para o alívio dos sintomas relacionados ao excesso de gases no aparelho digestivo, que geram flatulência, desconforto abdominal, aumento de volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não utilize **SIMETICONA** se tiver alergia ou sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Não use **SIMETICONA** se você apresentar algum dos seguintes sintomas: Distensão abdominal grave; Cólica grave; Dor persistente (mais que 36 horas); Massa palpável na região do abdômen; alergia a simeticona e a seus derivados; perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não ultrapassar a dose máxima indicada, a menos que sob orientação médica.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

SIMETICONA EMULSÃO GOTAS:

Armazenar em temperatura ambiente (entre 15°C a 30°C). Após aberto, válido por 6 meses.





SIMETICONA COMPRIMIDO: Armazenar em temperatura ambiente (entre 15°C à 30°C). Proteger da luz e umidade. **Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características físicas - emulsão oral: Emulsão viscosa, de coloração rosa claro e odor característico de cereja.

Características físicas - comprimido: Comprimido circular, com aspecto uniforme e coloração branca.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observar alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

SIMETICONA EMULSÃO ORAL

Cada 1 mL = 15 gotas (quando o frasco for mantido na posição vertical)

Uso pediátrico.

Crianças com até 2 anos: tomar 3 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 36 gotas/dia.

Crianças de 2 a 12 anos: tomar de 3 a 6 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 36 gotas/dia.

Uso adulto.

Adultos: tomar 8 a 25 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 100 gotas/dia.

Uso para Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia: modo de uso conforme indicação médica.

SIMETICONA COMPRIMIDO:

Uso Adulto:

Tomar 1-3 comprimidos. Se necessário, repetir essa dose com intervalo de 6 horas. Não ultrapassar a dose de 12 comprimidos/dia.

Uso pediátrico (de 2-12 anos):

Tomar 1 comprimido. Se necessário, repetir essa dose com intervalo de 6 horas. Não ultrapassar a dose de 6 comprimidos /dia.

Uso para Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia:

Modo de uso conforme indicação médica.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma ou mais doses deste medicamento, a posologia indicada deverá ser retomada, não havendo necessidade de repor as doses esquecidas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Pode ocorrer diarreia, náusea, regurgitação e vômito.

DIZERES LEGAIS

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

MEDICAMENTO NOTIFICADO, conforme RDC nº 576/2021.

Farmacêutico Responsável:
Rodrigo Rebelo Peters - CRF /SC 4116

Notificado e produzido por:
AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Rodovia SC, 390 Km 459, nº 500,
bairro Ilhota – Pedras Grandes - SC
CNPJ: 01.858.973/0001-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA

SIA Serviço de
Informação
Além
0800 646 2010
www.airela.com.br

airela
PHARMACÊUTICA



FC1558-CM702293-V2

